



Dissertationes
medicæ.

II.

610

Hop

1
2

*OBSERVATIO MEDICA
CIRCA
TINEAM CAPITIS
IN ISLANDIA QVONDAM EPIDEMICE
GRASSANTEM,
QVAM
SVB MODERAMINE
*Viri Amplissimi et Experientissimi
MATTHIAE SAXTORPH,
M. D. et Professoris in Universitate Regia, Nosocomii puer-
perarum ut et Metropolis Obstetricantis ordinarii, ad Nosoco-
mium ciicum adque institutum pauperum Medici, Regii colle-
gii medici, Regiaeque Scientiarum Societatis Noruegicae
Membri, Medicæ Hafnienis b. s. Secretarii.**


In
SOCIETATE EXERCITATO-
RIA MEDICA

Die Novembr. MDCCLXXVII,

M. L. Q. S.

Commititonum examini submittit
JOHANNES SVENDSEN.

HAFNIAE,
Litteris SIMMELKIAERIANIS.



DE
TINEA CAPITIS.

§. I.

VITIVM particulare capitis, ipsius superficiem capillatam cum ulceribus crustosis defaedans, auditoribus dicitur *Tinea*, promiscue quibusdam *Cerea*, *Fauus*, *Porrigo*, *Achores s. Lactumina s. Crusta lactea*.

HAC praesertim tamen temporibus, vnde quoque nomen dicit lactationis, etiam in facie, collo, imo per reliquam corporis cutim tenelli infantes defaedari obseruantur. Quando autem post ablactationem in superficie capillata capitidis simile vitium (id quod ergo vel de nouo vel ex Achoribus inueteratis

contingit) Tineam salutat celeberrimus
ETMULLERVS. vid. eiusdem T. II. pag.
1202.

§. 2.

Historia.

TINEAM in Islandia epidemicam aliquando noui cum XVI circiter abhinc annis, aeris iniuria longius vexante, res incolarum angusta domi adeo facta est, ut familiae tenerioris fortunae, sedes sparsim relinquere coactae fuerint.

HINC a marita maritus, ab vtrisque liberi, omnes autem ad vietum vbi cunque quaerendum, sedibus incertis vagabantur disiuncti. Liberi tunc inopia vestimentorum, alimenti, ceteraque necessaria cura carentes, frigus pati insolens, immutatis semper vestibus, quicquid etiam ad cibariorum genus latissime pertinet, assumere coacti, qui annos a VI ad XX, et quod facile superabat,

rabat, nati erant, tabe vniuersali cum Phtiriasi et Tinea capitis corripiebantur.

QVOCIRCA, concurrente simul phtiriasi in pilosa superficie capitis, cognoscetur malum incipiens, vbi vehementi pruritu inceperat acris ichor erumpere, surrexerunt crustulae inter capillos plus minus contiguae, quae, durante prurigine, quoties fricabatur, decesserunt, fricantis vnguem maculantes, relieto loco manante exulcerato.

VBI autem vitiatum caput ferentes, repurgandi neglecta cura diutius versabantur, incepit proserpere malum, rubescere cutis, largior prorumpens ichor, densiores breui crustas relinquere, sub quibus mox suppuratio facta, tandem relieto sibi malo, vlcera foetida satis atque profunda.

§. 3.

ORTVM docet malum a causa composita, nimirum crudis ingestis, materiam ab acida acrimonia peccanteim suppeditantibus, irritantibus externe fordinibus nec non phtiriasi, frigidioris aeris accessus, quantum adhuc infestus, nemo non videt.

SCIRe simul expedit, quod non solum infantes, verum quoque adolescentes, iuuenes, nonnunquam ipsos adultos infestat,

§. 4.

VNDE nec signum istius vitii pathognomicum latet, nempe ichorosa capillatae cutis eruptio, in latum atque profundum exulcerando serpens. Quare Tineam *a)* Herpetem quoque dixerunt quidam. Nisi ergo hanc ab illa

a) Est vero nomen desumptum a vermiculo *Tinea*, non quidem eo respectu, quod aliquando

illa §. I. distinguas, vix intelligi poterit, cur BLANCARDIVS, si divtius durent Achores, et tardius ad curationem disponuntur b). EBERHARDVS si in capite subsint crustae laetiae, vlcera manantia foetida, Tineam dixerint c). Cur Achores in benignos et malignos diuferit JVNCHERVS d). Cur vitium variam adeo prae se ferat faciem, vt nunc im-

A 4 peti-

quando adsit phthiriasis, vt obtrudere contendit BLANCARDIVS, (tunc enim datur causus complicatus) sed per analogiam, vti sc. iste vestes ita in capite acris ichor erumpens, cutim erodit atque exulcerat. Islandice audit Geitur vel in singulari Skridgeit a verbo skrida, serpere.

- b) Eiusd. Lexic. med.
- c) Conspectus medic. theoret. p. 2. Halae 1761.
- d) Conspectus Chirurgiae tam med. quam instrum. Achores itaque malignos ad Tineam refero.

petiginem nunc Herpetan Estiomenon
fere dixeris, contagiosum e) quippe,
epidemice graffetur et s. p.

§. 5.

LIQVET hinc qvoque species, in
quas autores Tineam distinxerunt, non
esse diuersas, sed varios saltim gradus
vitii vnius eiusdemque f).

§. 6.

e) Conf. Profess. experientiss. CALLIS, instit.
Chirurgiae hodiernae, Lib. II. pag. 428.

Vlceræ serpiginosa ob fermentescentem
ipsorum indolem, haud raro esse conta-
giofa, testatur JVNCHERVYS, idque sese ex-
ferere mediantibus vestimentis, etiam fer-
pendo in vicinas partes sanas ex loco af-
fecto; eiusd. Conspect. Chirurgiae tam
med. quam instrum.

f) Tales tres leguntur; vbi nempe exaspe-
rata squamis aridis cute capillata, dum ob
pruritum scalpitur, caedem sine vlceræ
deci-

SEDEM habet in cute, huius nimirum glandulis, in quibus humor acris a variis causis factus, erumpit, pustulas squamas, tuberculata vlcera excitans, in ueterato malo, adsuescit quasi humor largius euacuari, etiam a quoconque externo irritante, citius serius dispargit vlcera, pro squamis mox densiores formans crustas, cumque his semper magis additur, a collecto intus ichore, transitum isti simul negant, qui mox

A 5 inde

decidunt farinae similes, dixerunt *Tineam sicciam*, vbi autem rubra et inflammata cutē maiores squamæ et quasi crustae soluantur, vlcere relieto *Tineam ficosam*; Quando autem profundioribus ulceribus absque pruritu s. cruentantibus s. faniem manantibus etiam densiores crustæ tolluntur, *Tineam humidam lupinosam* dixerunt, v. ALLEN Synopf. vniu. med. Francof. et Lips. 1753. Conf. BLANC. Lexicon med.

inde solito acrior, rancidus tamen fit
ac putris, malum producit (§. 2.) de-
scriptum.

§. 7.

NASCITVR itaque ab omni, quod
materiam acrem (§. 6.) in caput ciere
potest s. interne in vniuersis humoribus,
vti falsum scorbuticum, venereum, a
crudis ingestis fabricatum acre quocun-
que, s. externe per contagium attract-
um, vel num aliquando in ipso enche-
phalo, nimia quippe pituita abundante,
fontem agnoscat. Certo saltim constat
in quibusdam adultis herpeticam per-
gere capitis capillatae eruptionem, etiam
a parentibus ad proles labem propagari,
subito quoque suppressam conuulsiones
ipsamque mortem creare, et vlcera capi-
tis reuocata subitum leuamen testari g).

Nec

g) Conf. illustr. ŠVIÉT. Ceminent. Tom. III.
pag. 421, 22, 34.

Nec omittendum est dari metastases, per quas miasma virulentum ex reliquo corpore ad caput deferri potest, quemadmodum post febres malignas *b)* vlcera suppressa, Tineam nasci notatum est *i).*

NEQVE ratio latet in infantibus, quibus nempe glutinosa acidaque lympha eruptiones excitat, speciatim capitatis Achores istos benignos dictos, vt et Fauum *k),* quoties in serpiginosam exulce-

b) Vide celeberr. Prof. CALLISEN Chirurg. ho-
diern. Lib. II.

i) JVNCHERI Conspect. Chirurg. tam med.
quam instrum.

k) Distinctionem inter Achores et Fauum Cru-
stam Laetream, atque Tineam, omnium
optime suppeditant. CALLIS. Institut Chi-
rurg. hodiern.

ulcerationem, declinant, donec pertinax satis malum mira vlcera relinquit *1)*, idque vel negligentia nutricum, curatione peruersa, causis quibusuis allatis supra §. 3.

§. 8.

Ex quibus ut et supra dictis intelligitur vitium, eius varius status incrementi, locus affectus, causae, etiam quod omni aetati, cuique vitae generi maxime eueniat, quare maciei aut tabi
se

1) In Comment. illustr. van SVIETEN, T. II., tristis legitur casus, vbi Tinea caput infantis cuiusdam vitiatum adeo effecerat, ut erosa ferè penitus bregmatis olla fuerunt, quaeque, licet iam mundata, plurimos tamen menses eundem spargebant foetorem, quem in viuo adhuc infante fere intolerabilem perceperunt omnes, qui adfuere.

se complicet, cur hoc infestatis oculi
hebetes atque tristes, dolor capitis, et
decolor in modum ietericorum, epi-
lepticorum chlorosi laborantium.

§. 9.

PROGNOSCITVR, quid metuendum,
si vel acris materia importune corrigatur,
vel si per valida nimis medicamenta re-
tropellatur, hoc cur diris adeo viam
sternit malis, vti asthmati conuulsiuo *m*),
Ophtalmiae *n*), Rachitidi *o*), Epilep-
siac *p*), Parotidibus *q*).

§. IO.

m) Quod gratus debo praelectionibus Celeber.
Prof. THODE.

n) Vide PLATNERI Institut. Chirurgiae.

o) In specie infantibus. Vide van SVIET. Com-
ment. Tom. V.

p) Eiusd. Tom. III.

q) Vid. JVNCKERI Conspectt. Chirurgiae.

§. IO.

QVORVM §. 8. et 9. cognitionem curatiua exigit intentio, pro vario vitii statu graduque dirigenda, ad moderandum saltim hoc, vel radicitus tollendum.

§. II.

AD curationem itaque conferunt interne purgantia, lympham corrigen-
tia; externe quaecunque acrem ichorem temperant, absorbent, vlcera quando adsunt, maturant, digerunt, exficcant, semper ratione habita ad mundandum radendumque caput r).

¶ Extrinsecus nil vtilius putat Celeberrimus PLATNERVS, tanti quoque mundandi cu-
ram aestimat, vt in omnibus vitiis, qui-
bus cutis infestatur, obseruandam esse
suadeat

suadeat moneatque; vide ejusd. Instit.
 Chirurg. pag. 516. In hoc itaque malo
 speciatim iubet squamas etiam crassiores
 radendo ita tollere, ut vlcera cruenten-
 tentur, et dari medicamenta ab initio
 nulla, post quae leniter reprimunt. In
 recenti malo, et quidem ad acrem humo-
 rem eliciendum proficuum videtur, si la-
 vetur e lixiuio saponis veneti, calido, lo-
 cus affectus, et postea tegetur emplastro
 aliquo aromatico, v. gr. ex una parte
 emplaſtri vesicatorii, octo partibus em-
 plaſtri de Labdano v. Meliloti permisto.
 In diuturniore malo quantum sit praesi-
 dium in bulbis capillorum euellendis legi-
 meretur citatus Profess. Celeberr. CALLI-
 SEN. In Colluuie vlcerum sanguinea,
 tentandum erit, quid iuuerint Hirudi-
 nes applicatae, in serosa vero satius fo-
 ret Setaceum in nucha instituere, quam
 validis reprimentibus vti. Ad vlcera

porro

porro sananda ut et crustam tollendam,
nec defunt remedia ab Auctoriibus magni
nominis, vii ETMULLERO, HOFFMANNO,
JVNCKERO etc. praescripta, quae vero
omnia hic recensere tam Spatii quam tem-
poris angustia vetat.

T a n t u m.

